

【リベルサス(経口セマグルチド)】体重減少の研究に関するデータまとめ

投与量	投与期間	体重減少の平均値	研究の対象	参考文献	備考
3mg	26週間	0.1kg	2型糖尿病	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31186300/	PIONEER1
7mg		0.9kg			
14mg		2.3kg			
14mg	52週間	3.8kg	2型糖尿病	https://www.msconnect.jp/products/rybelsus/clinical-results/pioneer2/	PIONEER2
3mg		-1.2kg	2型糖尿病	https://www.msconnect.jp/products/rybelsus/clinical-results/pioneer3/	PIONEER3
7mg		-2.2kg			
14mg		-3.1kg			
14mg	62週間	-4.2kg	2型糖尿病	https://www.msconnect.jp/products/rybelsus/clinical-results/pioneer6/	PIONEER6
14mg	52週間	-2.6 kg	2型糖尿病	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31189520/	PIONEER7
3mg	26週間	-0.5kg	2型糖尿病	https://www.msconnect.jp/products/rybelsus/clinical-results/pioneer9/	PIONEER9
7mg		-1.0kg			
14mg		-2.4kg			
3mg	26週間	-0.2kg	2型糖尿病	https://www.msconnect.jp/products/rybelsus/clinical-results/pioneer10/	PIONEER10
7mg		-1.0kg			
14mg		-2.2kg			
3mg	52週間	-0.0kg		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32333876/	
7mg		-0.9kg			
14mg		-1.6kg			
50mg	68週間	17.40%	過体重の成人	https://www.novonordisk.co.jp/content/dam/nncorp/jp/ja/news/media/2023/05/23-11.pdf	—

※令和6年10月作成